

CHEZ LE MÉDECIN

Niveau 3

IRVING ORTIZ

Monsieur Kanami se rend à l'hôpital. Son enfant ne se sent pas bien. Écoutez le dialogue et répondez aux questions ci-dessous.

1. Quels sont les symptômes?
 - a. Son fils fait de la fièvre mais il mange bien.
 - b. Son fils fait de la fièvre, il ne mange pas très bien et il vomit après avoir mangé.
 - c. Son fils fait de la fièvre, il mange bien mais il vomit après avoir mangé.
2. Qu'est-ce que monsieur Kanami a fait pour soulager les symptômes.
 - a. Il lui a fait boire beaucoup d'eau et il lui a donné du Tylenol.
 - b. Il lui a donné beaucoup d'eau pour baisser la fièvre.
 - c. Il lui a donné du thé avec du Tylenol.
3. La docteure a fait passer des tests au patient et...
 - a. le patient n'a rien. Tout est correct.
 - b. le patient a une infection. C'est une otite.
 - c. on ne sait pas quel est son problème. La docteure va lui faire passer plus de tests.
4. Qu'est ce que la docteure prescrit au patient?
 - a. La docteure lui conseille de continuer à prendre du Tylenol. La fièvre va baisser dans quelques heures.
 - b. La docteure lui donne des antibiotiques et lui prescrit du repos.
 - c. Le patient doit rentrer chez lui et se reposer.
5. Dans combien de temps le patient va aller mieux?
 - a. Avec le médicament, le patient va aller mieux dans quelques heures.
 - b. Avec le médicament, le patient va aller mieux dans deux ou trois jours.
 - c. Avec le médicament, le patient va aller mieux dans trois jours.
6. Pendant combien de temps et à quelle fréquence le patient doit-il prendre les antibiotiques?
 - a. C'est deux comprimés par jour: un le matin et un le soir pendant une semaine.
 - b. C'est trois comprimés par jour: un avant chaque repas pendant deux semaines.
 - c. C'est deux comprimés par jour: un le matin et un le soir pendant deux semaines.
7. Le traitement dure deux semaines au total ...
 - a. mais si le patient va mieux, il peut arrêter de prendre le médicament.
 - b. et si les symptômes continuent, le patient doit répéter le traitement.
 - c. et il doit finir le traitement même si le patient se sent mieux.